



MINI BULA
EXCLUSIVO PARA MATERIAL
PROMOCIONAL

Revisão: 01
Atualizado em: 08/03/2016
Págs.: 1/1

REGISTRO: COSMED
MARCA: POLARAMINE®
ATIVOS: MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA
APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDOS DE 2MG APRESENTA-SE EM EMBALAGEM COM 20
COMPRIMIDOS REVESTIDOS
DRÁGEA REPETABS DE 6MG APRESENTA-SE EM EMBALAGEM COM 12 DRÁGEAS
LÍQUIDO DE 2MG/5ML APRESENTA-SE EM FRASCO COM 120ML
GOTAS DE 2,8 MG/ML APRESENTA-SE EM FRASCO COM 20ML
CREME DERMATOLÓGICO APRESENTA-SE EM BISNAGAS DE 30 G

Polaramine® – maleato de dexclorfeniramina. Comprimidos de 2mg, Drágea Repetabs de 6mg, Líquido de 2mg/5mL, Gotas de 2,8mg/mL, Creme dermatológico 10mg/g. MS 1.0093.0082. Comprimidos, Drágea Repetabs, Líquido, Gotas: USO ORAL. Creme dermatológico: USO DERMATOLÓGICO. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. INDICAÇÕES: indicado para alergia, prurido, rinite alérgica, urticária, picada de inseto, conjuntivite alérgica, dermatite atópica e eczemas alérgicos. **CONTRAINDICAÇÕES:** contraindicado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula ou a outros anti-histamínicos de estrutura química similar. Polaramine®, como os demais antihistamínicos, não deve ser usado em prematuros ou recém-nascidos e em pacientes que estão fazendo uso de inibidores da monoaminoxidase (IMAOs). **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Interações medicamento-medimento:** os IMAOs prolongam e intensificam os efeitos dos anti-histamínicos, podendo ocorrer hipotensão arterial grave. O uso de anti-histamínicos com álcool e medicamentos para depressão, podem potencializar os efeitos sedativos. A ação dos anticoagulantes orais pode ser diminuída por anti-histamínicos. Depressores do sistema nervoso central como sedativos, hipnóticos e tranquilizantes, podem potencializar os efeitos sedativos. **Interações em testes laboratoriais:** o tratamento com Polaramine® deverá ser suspenso dois dias antes da execução de teste de pele para detectar alergia, pois este medicamento poderá afetar os resultados destes testes. **REAÇÕES ADVERSAS:** poderá ocorrer sonolência leve ou moderada durante o uso deste medicamento. **POSOLOGIA: Comprimidos revestidos: Adultos e crianças maiores de 12 anos:** 1 comprimido 3 a 4 vezes por dia. **Crianças de 6 a 12 anos:** 1/2 comprimido três vezes por dia. **Drágea Repetabs: Adultos e crianças maiores de 12 anos:** 1 drágea pela manhã e outra ao deitar. **Líquido: Adultos e crianças maiores de 12 anos:** 5mL 3 a 4 vezes por dia. **Crianças de 6 a 12 anos:** 2,5mL três vezes por dia. **Crianças de 2 a 6 anos:** 1,25mL três vezes por dia. **Gotas: Adultos e crianças maiores de 12 anos:** 20 gotas, três a quatro vezes por dia. **Crianças de 6 a 12 anos:** 10 gotas ou 1 gota para cada 2kg de peso, três vezes por dia. **Crianças de 2 a 6 anos:** 5 gotas ou 1 gota para cada 2kg de peso, três vezes por dia. **Crema dermatológico:** Aplicar Polaramine® crema sobre a área da pele afetada duas vezes ao dia. **SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. MB01/16. Mês/ano**

A mini bula deve ter no mínimo de 2mm.

Executado por: JULIANA COLONELLI

Aprovado Regulatórios: VALÉRIA MEREU

Aprovado Área Médica: MÁRCIO ELIAS